

Kondisi yang TIDAK memperbolehkan anak Imunisasi



- ♣ Sakit berat, demam tinggi (panas lebih > 38°C), disertai kejang
- ♣ Reaksi berlebihan (alergi) setelah diberikan salah satu jenis imunisasi → imunisasi yang sama tidak dilanjutkan

KONDISI YANG MUNCUL SETELAH IMUNISASI

Hepatitis B	Kemerahan dan nyeri ditempat suntikan
BCG	2 minggu setelah imunisasi, timbul pembengkakan kecil dan merah di tempat suntikan, lalu timbul bisul kecil dan menjadi luka parut
Pentabio	Bayi panas sore hari setelah imunisasi, akan turun dalam 1-2 hari. Ditempat suntikan merah serta nyeri (tidak berbahaya dan akan sembuh sendiri).
Polio	Reaksi Polio umumnya tidak ada
MR	Anak mungkin panas dan timbul kemerahan

Hal-Hal Yang Perlu Diingat !!!

1. Demam yang tidak terlalu tinggi bukan merupakan penghalang bagi anak untuk mendapatkan imunisasi.
2. Diare ringan bukan merupakan halangan untuk mendapatkan imunisasi.
3. Imunisasi ulangan sebaiknya diberikan untuk memperkuat kekebalan yang sudah didapat pada waktu bayi. Imunisasi ulangan antara lain :
 - Imunisasi MR ulangan saat usia 24-36 bulan.
 - Imunisasi Pentabio ulangan saat usia 18 bulan.



Imunisasi Dasar

Lengkap

041/LF/PKRS/RSSH/2022



CAPAI IMUNISASI RUTIN LENGKAP
Bersama Melindungi dan Terlindungi



RSU SARILA HUSADA

Love them
Protect them
Immunize them



APA sih IMUNISASI itu ?

Imunisasi adalah suatu usaha untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak terhadap penyakit tertentu

Apa Manfaatnya?

- Daya tahan/kekebalan tubuh anak meningkat
- Mencegah timbulnya berbagai penyakit.



Semua bayi dan anak sehat umur 0-12 bulan harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap

Imunisasi Dasar Lengkap.

Yang Termasuk Imunisasi Dasar Bagi Bayi Usia 0-12 Bulan :

- ♥ **Imunisasi BCG** untuk melindungi bayi dari penyakit Tuberkolosis
- ♥ **Imunisasi polio** untuk melindungi bayi dari penyakit polio (lumpuh layu).
- ♥ **Imunisasi Hepatitis B (HB)** untuk melindungi bayi dari Hepatitis B
- ♥ **Imunisasi Pentabio** untuk melindungi bayi dari penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus, meningitis dan pneumonia
- ♥ **Imunisasi MR** untuk melindungi bayi dari penyakit Measles dan Rubela.

Imunisasi



“Imunisasi melindungi diri dari penyakit mencegah **kecacatan** dan **kematian**”

Dimana Imunisasi dapat diperoleh??

- ~ POSYANDU
- ~ PUSKEMAS
- ~ Praktek dokter/bidan
- ~ Rumah Sakit



KAPAN BAYI IMUNISASI ??

LIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP UNTUK BAYI USIA DI BAWAH 1 TAHUN

UMUR BAYI	JENIS IMUNISASI
< 7 HARI	HEPATITIS B (HB) O
1 BULAN	BCG, POLIO 1
2 BULAN	PENTABIO 1, POLIO 2
3 BULAN	PENTABIO 2, POLIO 3
4 BULAN	PENTABIO 3, POLIO 4, IPV
9 BULAN	MR

IMUNISASI LANJUTAN

18 BULAN	PENTABIO BOSTER
24 BULAN	MR BOSTER

Imunisasi BCG dilengan Kanan Atas.



Imunisasi MR dilengan Kiri Atas.



Imunisasi polio diberikan Melalui Mulut.

Imunisasi HB, Pentabio dan IPV di paha bagian luar.

